

## 8. melléklet

### A kiütéses tífuszra vonatkozó eljárás szabályai

#### Typhus exanthematicus

Kiütéses tífusz, BNO10: A75.0 és A75.1

**Kórokozó:** Rickettsia prowazeki

#### Teendők a beteggel

**a. Jelentés:** Bejelentésre kötelezett a valószínűsített és a megerősített eset. Egy megbetegedést csak egyszer kell bejelenteni. Telefonon vagy faxon is jelentendő az ÁNTSZ-OEK Járványügyi osztályának és a megbetegedés helye szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek. Ugyanígy kell eljárni a Brill-Zinsser betegség esetén is.

#### Esetek osztályozása

<b>Gyanús eset</b>	---
<b>Valószínűsíthető eset</b>	Teljesülnek a klinikai feltételek és a valószínűsített eset laboratóriumi feltételei.
<b>Megerősített eset</b>	Teljesülnek a klinikai és a megerősített eset laboratóriumi feltételei.

#### Feltételek

<b>Klinikai kritérium</b>	Általában kiütéssel járó lázas megbetegedés.
<b>Epidemiológiai kritérium</b>	---
<b>Laboratóriumi kritérium</b>	<i>A megerősített eset laboratóriumi feltétele:</i> – Rickettsia ellenanyagok legalább négyszeres titeremelkedése két vérminta vizsgálata alapján. <i>A valószínűsített eset laboratóriumi feltétele:</i> – Pozitív Weil-Félix reakció.

**b. Elkülönítés:** Kötelező. A beteget azonnal ható módszerrel történt tetvetlenítés után kórházban fertőző osztályon kell elkülöníteni.

**c. Mikrobiológiai vizsgálat:** **Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:** Kötelező.

**Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:** Kötelező. Beküldendő 5 ml alvadásgátló nélkül, a betegség kezdetekor, majd 3 hét múlva levett natív vér komplementkötési reakció céljára az ÁNTSZ-OEK-ba

**Felszabadító vizsgálat:** Nem szükséges.

**d. Fertőtlenítés:** Szigorított folyamatos és záró-fertőtlenítés végzendő, melyet a kistérségi népegészségügyi intézet ellenőriz. A fertőző beteg vagy arra gyanús személy környezetében azonnal folyamatos fertőtlenítés megkezdése szükséges. A tetűmentesítésen kívül fertőtleníteni kell a beteg vagy az erre gyanús személy környezetét (lakását, tartózkodási helyét), fehéreneműjét, alsóneműjét, ágyneműjét stb., valamint a beteggel érintkezésbe került és járványügyi megfigyelés alá vont személyeket is. A beteg vagy arra gyanús személy, illetve kontakt személyek testét 2%-os Liquor kresoli saponatus oldattal kell lemosni. A textíliák fertőtlenítésére elsősorban a hőhatáson alapuló fertőtlenítési módszereket (kifőzés, áramló vízgőz, túlnyomásos gőz stb.) kell alkalmazni. Kémiai fertőtlenítő eljárásokhoz (beáztatás stb.) aldehid hatóanyagú dezinficiens alkalmazása indokolt.

### Teendők a beteg környezetében

<b>a. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:</b>	Kötelező. Tetvességi vizsgálat, szükség esetén tetvetlenítés azonnal ható módszerekkel a kistérségi népegészségügyi intézet irányításával, a tetűmentes állapot fenntartása.
<b>b. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:</b>	A lázasnak talált és a betegségre gyanús személyektől ugyanúgy kell vért vizsgálatra beküldeni, mint ahogy az a beteg esetében történt.
<b>c. Járványügyi megfigyelés:</b>	A beteg környezetében élő személyeket 12 napra járványügyi zárlat alá kell helyezni.
<b>d. Postexpozíciós profilaxis:</b>	Nem szükséges.
<b>e. Fertőzőforrás-kutatás:</b>	Kötelező.
<b>f. A terjesztő közeg felderítése:</b>	---

### A visszatérő lázra vonatkozó eljárás szabályai

#### Febris recurrens

Visszatérő láz, BNO 10:A68.0

**Kórokozó:** Borrelia recurrentis

#### Teendők a beteggel

**a. Jelentés:** Bejelentésre kötelezett a valószínűsített és a megerősített eset. Egy megbetegedést csak egyszer kell bejelenteni. Az értesülést követően sürgősséggel is jelentendő.

#### Esetek osztályozása

<b>Gyanús eset</b>	---
<b>Valószínűsíthető eset</b>	Teljesülnek a klinikai és az epidemiológiai feltételek.
<b>Megerősített eset</b>	Teljesülnek a klinikai és a laboratóriumi feltételek.

#### Feltételek

<b>Klinikai kritérium</b>	2-9 napig tartó láz, majd 2-4 napos láztalan szakot követő többször visszatérő láz és <ul style="list-style-type: none"> <li>- sárgaság</li> <li>- a lép megnagyobbodása.</li> </ul>		
<b>Epidemiológiai kritérium</b>	Ruhatetvesség.		
<b>Laboratóriumi kritérium</b>	A Borrelia recurrentis kimutatása vérkenetből.		
<b>b. Elkülönítés:</b>	A beteget azonnal ható eljárással történt tetvetlenítés után infektológiai osztályon kell elkülöníteni.		
<b>c. Mikrobiológiai vizsgálat:</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:</b></td> <td>Kötelező.</td> </tr> </table>	<b>Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:</b>	Kötelező.
<b>Klinikai mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:</b>	Kötelező.		

	<b>Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat:</b>	Kötelező. A betegség gyanúja esetén - előzetes megbeszélés alapján - tárgylemezen kihúzott vérkenet és vastag csepp küldendő az ÁNTSZ-OEK Bakteriológiai osztályára.
	<b>Felszabadító vizsgálat:</b>	Nem szükséges.
<b>d. Fertőtlenítés:</b>	A beteget azonnal ható eljárással tetvetleníteni szükséges és gondoskodni kell a tetűmentes állapot fenntartásáról.	

### Teendők a beteg környezetében

<b>a. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:</b>	Kötelező.
<b>b. Járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálat:</b>	Nem szükséges.
<b>c. Járványügyi megfigyelés:</b>	A beteggel közös háztartásban élő személyeket 14 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. A megfigyelést rendszeres tetvességi vizsgálatokkal kell kiegészíteni. Ha a tetűmentes állapot fenntartása nem biztosítható, 14 napra járványügyi zárlatot kell elrendelni.
<b>d. Postexpoziációs profilaxis:</b>	Nem szükséges.
<b>e. Fertőzőforrás-kutatás:</b>	Kötelező.