

**A monitor rendszerben 2009. évben *Enterococcus* spp. törzsek antibiotikum érzékenysége**

Antibiotikum	Ampicillin	Gentamicin (High level)	Streptomycin (High level)	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Vancomycin	Teicoplanin	Tetracyclin	Quinupristin/ dalfopristin	Linezolid
--------------	------------	----------------------------	------------------------------	---------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------	-----------

<i>Enterococcus faecalis</i>										
Érzékeny (%)	99,5	77,6	70,2	38,3	65,9	100,0	100,0	19,8	5,9	98,8
Mérsékelt (%)	0,0			37,5	14,3	0,0	0,0	0,3	1,2	0,9
Rezisztens (%)	0,5	22,4	29,8	24,2	19,8	0,0	0,0	79,9	92,9	0,3
Törzs (beteg)	16374	7709	2900	9984	6637	15526	11733	5258	2022	2223

<i>Enterococcus faecium</i>										
Érzékeny (%)	4,8	24,7	43,4	4,5	16,3	98,3	98,0	59,4	72,1	99,5
Mérsékelt (%)	0,0			7,2	2,1	0,1	0,0	0,0	1,2	0,0
Rezisztens (%)	95,2	75,3	56,6	88,3	81,6	1,6	2,0	40,6	26,7	0,5
Törzs (beteg)	690	493	175	402	331	758	563	180	165	195