

A monitor rendszerben 2008 évben nem vizelet mintákból jelentett *Staphylococcus aureus* törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacín	Moxifloxacín	Gentamicin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Doxycyclin	Quinupristin\ dalopristin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim
--------------	------------	-----------	---------------	--------------	------------	----------	--------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	------------------------------	-----------	-----------	------------

Járóbeteg mintákból izolált törzsek

Érzékeny (%)	9,1	94,4	93,4	94,9	97,4	96,6	82,7	84,9	100,0	100,0	99,5	87,2	91,2	100,0	99,7	97,9	98,1
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,6	0,6	0,2	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Rezisztens (%)	90,9	5,6	6,0	4,5	2,4	2,9	17,1	15,0	0,0	0,0	0,4	12,6	7,8	0,0	0,3	2,1	1,7
Törzs (beteg)	17744	18247	13916	7752	15709	5691	18129	18089	16935	7771	6850	12535	3723	300	398	2761	17336

Fekvőbeteg mintákból izolált törzsek

Érzékeny (%)	8,1	78,3	75,4	80,5	93,2	89,7	70,7	73,1	99,9	100,0	97,8	89,2	90,7	99,4	99,6	93,6	96,9
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,6	1,0	0,3	1,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	1,2	0,0	0,0	0,1	0,3
Rezisztens (%)	91,9	21,7	24,0	18,5	6,5	9,1	29,0	26,7	0,0	0,0	2,2	10,7	8,1	0,6	0,4	6,3	2,8
Törzs (beteg)	13773	14346	10175	6083	12821	4725	14124	14090	13413	5379	4225	8300	3095	334	695	2017	13159