

A monitor rendszerben 2010. évben jelentett *Staphylococcus aureus* törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacín	Moxifloxacin	Gentamicin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Doxycyclin	Quinupristin/ dalfopristin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim
--------------	------------	-----------	---------------	--------------	------------	----------	--------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	------------

Járóbeteg mintákból izolált törzsek

Érzékeny (%)	11,2	93,2	91,7	95,7	98,4	94,7	81,8	83,6	100,0	100,0	99,2	90,3	92,7	99,6	100,0	98,6	98,7
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,6	0,4	0,1	0,4	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
Rezisztens (%)	88,8	6,8	7,7	3,9	1,5	4,9	18,1	16,2	0,0	0,0	0,8	9,6	7,0	0,4	0,0	1,4	1,2
Törzs (beteg)	22416	23419	17649	7901	13392	3605	23201	23132	21556	14707	5597	7600	5179	479	3577	4227	22947

Fekvőbeteg mintákból izolált törzsek

Érzékeny (%)	9,8	76,3	73,4	81,3	93,1	90,7	70,9	72,7	99,9	100,0	98,2	91,1	91,8	99,1	99,8	96,8	96,3
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,4	1,1	0,1	0,6	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,5	0,3	0,0	0,1	0,3
Rezisztens (%)	90,2	23,7	26,2	17,6	6,8	8,7	29,0	27,1	0,0	0,0	1,7	8,8	7,7	0,6	0,2	3,1	3,4
Törzs (beteg)	16848	17873	12226	7237	14330	5446	17551	17437	16094	8457	6564	7566	5199	463	3318	4063	17366